



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت غذا و دارو

آنفلوانزا

و

باورهای رایج اشتباه

در باره واکسن آنفلوانزا



تهیه شده در:

دفتر تحقیق توسعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

نشانی: تهران، میدان آزادی، خیابان الوند، پلازه ۲۰

شماره تلفن: ۸۸۷۷۹۱۱۸ داخلي ۱۰۴ و ۱۲۵

پایگاه اینترنتی: WWW.Fdo.iums.ac.ir

شهریور ماه سال ۱۳۹۶

X باور اشتباه: واکسن آنفلوانزا باعث تضعیف سیستم ایمنی می شود.

صحیح: این واکسن نه تنها باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن نمی شود بلکه آن را در مقابل ویروس آنفلوانزا تقویت می کند و بهبود می بخشد.

خانم های باردار و افرادی که حساسیت دارند باید قبل از تزریق واکسن آنفلوانزا به پزشک مراجعه کنند.

افرادی که برای اولین بار این واکسن را می زنند، ممکن است دچار درد ماهیچه ها و خستگی شوند. اگرچه این علائم ممکن است با آنفلوانزا اشتباه گرفته شوند، اما باید دانست که علائم آنفلوانزا طولانی تر و بسیار شدیدتر هستند.

X باور اشتباه: واکسن آنفلوانزا افراد را نسبت به تمام سرماخوردگی ها مقاوم می کند.

صحیح: سرماخوردگی، سرفه یا ناراحتی معده و اسهالی که توسط باکتری یا ویروس ایجاد شده، ربطی به آنفلوانزا ندارد و واکسن نمی تواند فرد را در مقابل آن ها محافظت کند.

X باور اشتباه: آنفلوانزا یک بیماری ویروسی خفیف است و خطرناک محسوب نمی شود.

صحیح: آنفلوانزا بیماری ساده ای نیست. جدیت این بیماری در حدی است که هر ساله ۲۵۰ الی ۵۰۰ هزار نفر فرد بالغ در سراسر جهان در اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند.

باورهای رایج اشتباه

X باور اشتباه: واکسن آنفلوانزا باعث ایجاد بیماری آنفلوانزا می شود.

صحیح: واکسن تزریقی آنفلوانزا حاوی ویروس کشته شده است و تزریق آن موجب بروز آنفلوانزا نمی شود، اما عوارضی خفیف مانند تورم، تب جزئی و درد بدن ممکن است رخ دهد.

X باور اشتباه: افرادی که تاکنون دچار آنفلوانزا نشده اند، به طور طبیعی نسبت به این عفونت مصون هستند.

صحیح: گونه های مختلف ویروس آنفلوانزا هر سال تغییر می یابند. در نتیجه نمی توان گفت مصنونیت گذشته افراد باعث می شود در برابر انواع جدید این ویروس در آینده در امان باشند.

X باور اشتباه: واکسن آنفلوانزا عوارض جانبی شدیدی دارد.

صحیح: واکسن آنفلوانزا ایمن است و در بیشتر افراد هیچ واکنشی جز تورم و قرمزی محل تزریق ایجاد نمی کند.



تزریق واکسن در کسانی که سابقه واکنش الرژیک به مواد موجود در واکسن آنفلوانزا را دارند مانند تخم مرغ، فرمالدھید، جنتامایسین، کسانی که در زمان مراجعه برای تزریق واکسن تب یا عفونت حاد داشته باشند، کسانی که سابقه ابتلاء به سندروم گیلن باره را داشته باشند و شیر خواران زیر شش ماه ممنوع است. بسیاری از افراد جامعه نیازی به مصرف واکسن آنفلوانزا ندارند، مصرف این واکسن در اطفال و افرادی که نقص ایمنی داشته و یا افراد بالای ۶۵ سال که بیماری های زمینه ای مانند آسم، فشار خون بالا، دیابت، مشکلات ریوی و کبدی، نارسایی کلیوی و کم خونی دارند و همه کسانی که به نوعی با داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی سروکار دارند توصیه می شود.

راه های پیشگیری و درمان

شستن مکرر دست ها سبب کاهش خطر ابتلا می شود زیرا ویروس توسط صابون غیرفعال می شود. استفاده از ماسک هنگام ترد در مکان های عمومی و مصرف دستمال کاغذی هنگام سرفه و عطسه بسیار مفید است. به جز رعایت اصول بهداشتی یکی از مهم ترین توصیه های پزشکان در مورد پیشگیری از ابتلا به این ویروس تزریق واکسن است. بسیاری از واکسن ها تأثیر دوره ای دارند زیرا این ویروس به سرعت تکامل می یابد، به همین دلیل هر سال نیاز به تزریق واکسن جدید است.



بر اساس دستور سازمان بهداشت جهانی اولویت تزریق واکسن به این ترتیب است: بیماران دیالیزی و پیوند کلیه، بیماران تالاسمی مژوز، بیماران کبدی شامل سیروز و پیوند کبد، بیماران سرطانی که تحت شیمی درمانی یا رادیوتراپی قرار دارند و در آخر پرسنل بهداشتی درمانی.

هرچند دوره معمولی بیماری ۳ تا ۴ روز است اما چون در جریان آنفلوانزا میکروب های دیگری به بدن حمله می کنند سبب پیدایش عفونت های ثانویه به خصوص در دستگاه تنفس می گردد و این بدان معنا است که آنفلوانزا مقاومت بدن را کم کرده و آن را برای دچار شدن به بیماری های دیگر آماده می سازد.

به کار بردن ماسک، تهویه هوای اتاق بیماران و جدا کردن سریع مبتلایان از افراد سالم تا حدی مانع شیوع آنفلوانزا می شود.

اگر این بیماری سریع تر درمان نشود دستگاه تنفسی و کبد را از کار می اندازد.

در صورت بروز علائم زیر باید سریعاً به مراکز درمانی مراجعه نمود:

- * افزایش تب یا سرفه * وجود خون در خلط
- * درد گوش * تنگی نفس یا درد قفسه سینه
- * ترشحات غلیظ از بینی * سینوس ها یا گوش ها
- * درد سینوس * درد یا سفتی گردن.

علائم و عوارض

علائم بیماری می تواند خفیف یا شدید باشد. تب و لرز، سردرد، دردهای عضلانی از جمله کمردرد و خستگی، سرفه که ممکن است با خلط همراه باشد، گلودرد، ایجاد زخم هایی داخل دهان، بینی و روی سطح پوست، خشونت صدا، استفراغ. گلودرد، خارش بدن و کوفتگی از علائم شایع بیماری هستند. این علائم معمولاً دو روز پس از مواجهه با ویروس بروز می کنند و معمولاً کمتر از یک هفته باقی می مانند. با این حال سرفه کردن ممکن است بیش از دو هفته مشاهده شود. حالت تهوع و استفراغ نیز ممکن است در کودکان و بزرگسالان مشاهده شود. شیوع ناگهانی انواع مختلف آنفلوانزا تقریباً هر سال زمستان رخ می دهد و شدت آن ها متفاوت است. هم چنین کسانی که قبل از دچار این بیماری نشده اند امکان بروز این بیماری در آن ها بیشتر است.



روش انتقال بیماری

ویروس آنفلوانزا از طریق عطسه در هوا جریان می یابد. هم چنین توسط تماس دست با سطوح آلوده به ویروس و سپس تماس دست با چشم یا دهان می تواند منتقل شود. فرد آلوده به ویروس آنفلوانزا پیش یا در طی مدت زمانی که بیمار است می تواند سبب آلوده شدن دیگران شود.



HiDoctor.ir

آنفلوانزا یا گریپ یک بیماری واگیردار است که توسط انواعی از ویروس ها ایجاد می شود. این نوع ویروس ها باعث ایجاد بیماری در پرندگان و پستانداران می شوند. بر اثر آنفلوانزا، عفونت حاد دستگاه تنفسی رخ می دهد که با سردرد ناگهانی، درد ماهیچه، تب و ضعف و بی حالی شدید نمایان می شود. این بیماری در موارد حاد به خصوص در خردسالان ممکن است باعث سینه پهلو شود. سه گونه ویروس آنفلوانزا به نامهای A, B, C وجود دارد و در حالت معمولی دوره بیماری ۳ تا ۴ روز است. در افرادی که دچار بیماری های قلبی، ریوی، کلیوی، دیابت و آسم هستند و یا در خانم های باردار امکان ابتلا به آنفلوانزا افزایش می یابد. هم چنین کودکان و سالمندان به علت سیستم دفاعی ضعیف تر بیشتر به این بیماری مبتلا می شوند. چون این بیماری واگیر دار است در مکان های عمومی امکان انتقال این بیماری زیاد می باشد.

