

جدول راهنمای واکسیناسیون

نوع واکسن	سن	نوع واکسن	سن
پنوموکوک - MMR	۱۲ ماهگی	ب، ث، ژ - فلج اطفال خوراکی - هپاتیت ب	بدو تولد
MMR- سه گانه - فلج اطفال خوراکی	۱۸ ماهگی	فلج اطفال خوراکی - پنج گانه* - روتاویروس- پنوموکوک	۲ ماهگی
سه گانه *** - فلج اطفال خوراکی	۶ سالگی	فلج اطفال خوراکی- پنج گانه- فلج اطفال تزریقی- روتاویروس- پنوموکوک	۴ ماهگی
		فلج اطفال خوراکی- پنج گانه- فلج اطفال تزریقی- روتاویروس- سرخک**	۶ ماهگی

توضیحات: \* واکسن پنجگانه شامل دیفتی، کزاز، سیاه سرفه، هپاتیت ب، هموفیلوس آنفلوانزا تیپ ب می باشد.

\*\* این واکسن در حال حاضر با توجه به مصوبه کمیته کشوری ایمن سازی در بعضی از استان های خاص حسب ابلاغ مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سن ۶ ماهگی تزریق می گردد.

\*\*\* پس از آخرین نوبت واکسن سه گانه، هر ده سال یکبار واکسن دوگانه بزرگسالان باید تزریق شود.

جدول تقویم واکسیناسیون

نام یا مهر واکسیناتور	سریال واکسن	تاریخ مراجعه	نوع واکسن	نام یا مهر واکسیناتور	سریال واکسن	تاریخ مراجعه	نوع واکسن		
			بار اول	پنج گانه (DTP, HepB, Hib)			بدو تولد	ب، ث، ژ (BCG)	
			بار دوم				بدو تولد	فلج اطفال خوراکی (OPV)	
			بار سوم				بار اول		
			بار اول	سه گانه/ توام (DTP/DT)			بار دوم		
			بار دوم				بار سوم		
			بار اول	MMR			یادآور ۱		
			بار دوم				یادآور ۲		
			بار اول	روتاویروس			بار اول	پنوموکوک	
			بار دوم				بار دوم		
			بار سوم				بار سوم		
			بدو تولد	هپاتیت ب			بار اول	فلج اطفال تزریقی (IPV)	
			نوبت صفر	سرخک (M)			بار دوم		